



โรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ได้ฉีดวัคซีน



เป็นอาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย



ระยะแรก

ระยะตื้นเต้น

ระยะอัมพาต

- นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เก็บตัว
- หวาดระแวง ม่านตาขยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

- น้ำลายไหล
- คงห้อยตก
- ล้มลง ตาย

อย่าแหย



ทำให้สุนัขกรีดร้อง

อย่าเหยียบ



หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ

อย่าแยก



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ
เปล่า

อย่าหยิบ



อาหารที่สุนัขกำลังกิน

อย่ายุ่ง



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ




เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค
ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย ๑๐๐%

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย




ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



ใส่ยา เบตาดีน




หากหากฉีดวัคซีนต้อง^{มาตามนัดทุกครั้ง}

*****คำแนะนำสำหรับผู้เสี่ยง*****



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

ค่าา
ด้วย
กันสุนัขกัด



โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท
จากสัตว์สูงคุณ เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด
เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน



อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เปื่อยอาหาร



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง




ระยะที่ ๓

ภาวะหายใจลำบาก
หัวใจหยุดเต้น coma
และเสียชีวิต




๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้
สัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด
รีบไปพบแพทย์ทันที
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน

